



# סביבה

פרק





## מפה 8.1 רמת זיהום החופים, 2012

**מקורות הנתונים:** קובץ איכות מי חופים, משרד הבריאות.

המפה מציגה נתונים לשנת 2012 על החריגות בבדיקות לגילוי חיידקי אנטרוקוק צואתי בים סוף ובים התיכון ובבדיקות לגילוי חיידקי קוליפורם צואתי בכנרת.

### הים התיכון

אחוז הבדיקות החריגות לגילוי חיידקי אנטרוקוק צואתי בים התיכון היה 5.9% בשנת 2012. בשנת 2012 נרשמו חריגות בבדיקות לגילוי חיידקי אנטרוקוק צואתי ב-56% מהחופים, בדומה לשנת 2011. חופי הרחצה שבהם נרשם האחוז הגבוה ביותר של חריגות בשנת 2012 הם חוף השרון (16.2%) וחוף שרתון בתל אביב-יפו (15.7%). בכל החופים דרומית לראשון לציון לא נרשמו חריגות.

### ים סוף

אחוז הבדיקות החריגות לגילוי חיידקי אנטרוקוק צואתי בים סוף היה 1.6% בשנת 2012. מאז שנת 2001 לא עולה אחוז הבדיקות החריגות בים סוף על 2%.

### הכנרת

אחוז הבדיקות החריגות בכנרת אינו יציב על פני השנים. אחוז זה ירד מ-3.5% בשנת 2001 לכמעט אפס בשנת 2004, ולאחר שהגיע ל-4.5% בשנת 2006 ירד ל-2.2% בשנת 2008. בשנת 2012 אחוז החריגות היה 0.7%. חריגות נרשמו ב-7 מתוך 35 חופים (20%).



